

## LE DÉCOLLEMENT DE LA RÉTINE



*Informations générales*

### Hôpital Maisonneuve-Rosemont

#### Adresse postale

5415, boul. de l'Assomption  
Montréal QC H1T 2M4  
Téléphone: (514) 252-3400

- Appliquez les gouttes selon la méthode d'application enseignée et le nombre de fois prescrit ;
- Selon la technique d'intervention utilisée, l'ophtalmologiste vous suggérera peut-être l'achat du M.A.T afin d'observer les directives opératoires consistant à garder le visage vers le bas.

## Définitions

La rétine est le film qui capte l'image et la transmet au cerveau par le nerf optique.

La choroïde est une membrane contenant des vaisseaux sanguins nourrissant la rétine.

Le décollement de la rétine est la séparation de la rétine de la choroïde provoquant une perte de vision selon le (s) secteur (s) affecté (s) par le décollement. La perte de vision devient totale ou définitive si la rétine n'est pas recollée.

## Les causes

- Le diabète,
- La malformation congénitale,
- La dégénérescence du vitré ou de la rétine,

- L'hérédité,
- Les traumatismes oculaires,
- Le cancer,
- Une forte myopie.

## **Le traitement**

Le traitement chirurgical consiste à fixer la rétine à la choroïde afin d'éviter une perte de vision totale ou définitive.

Un examen minutieux de la rétine est fait pour localiser la ou les déchirures.

Différentes techniques d'intervention peuvent être faites et même combinées :

- Une bague «buckle» de silicone est mise en place pour repositionner la rétine contre la choroïde.

- La cryothérapie (application de froid), la diathermie (chaleur) ou le laser seront responsables de l'adhérence de la rétine à la choroïde.
- La rétine peut être tamponnée par un gaz spécial (rétinopexie pneumatique).
- L'intervention d'une durée approximative de 60 à 90 minutes se fait sous anesthésie régionale et occasionnellement sous anesthésie générale.

## **Pré-requis pour la chirurgie**

- Si votre état de santé l'exige, un bilan de santé pourra être demandé.

### **Jusqu'à votre chirurgie :**

- Limitez vos déplacements ;
- Respectez la position assignée par votre ophtalmologiste, s'il y a lieu ;