


SURVEILLANCE ET SOINS DE VOTRE CATHÉTER VEINEUX CENTRAL



Unité de dialyse

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

5415, boul. de l'Assomption
Montréal QC H1T 2M4
Téléphone: (514) 252-3400
www.maisonneuve-rosemont.info

Tous droits réservés
©HMR, 2004

CP-MED-023

Pour vous, pour la vie

Numéros de téléphone

Hémodialyse

Tél. : 252-3427

Lundi au samedi

7h30 à 23h30

Infirmière au suivi des accès

Tél. : 252-3400 poste 4019

Lundi au vendredi

8h30 à 16h30

Si votre appel ne peut attendre les heures d'ouverture
du centre de dialyse

Tél. : 252-3400 poste 3523 Urgence

Samedi 23h30 au lundi 07h30

Pansement

Un pansement transparent est appliqué sur le cathéter en
tout temps :


- . Pour protéger le site de sortie du cathéter afin de le garder
bien propre et à l'abri des microbes.
- . Pour fixer le cathéter solidement à la peau et éviter qu'il se
déplace.

Surveillance et précautions

- . Éviter les mouvements brusques ou excessifs avec le bras
du côté du cathéter.
- . Éviter les objets pointus ou tranchants près du cathéter
(ex : épingles ou ciseaux ou rasoir).
- . Éviter de vous gratter au site du pansement.
- . Vérifier votre pansement à tous les jours et assurez-vous
qu'il est propre et bien fixé à la peau.
- . Attention aux parfums et aux produits de toilette : ne pas
appliquer dans le cou ou près du pansement (l'alcool dans
ces produits peut endommager le pansement transparent).

. Les bouchons blancs aux extrémités des branches du cathéter doivent toujours être en place (A).

Les clamps blancs ou pinces doivent être fermés (B).



. Votre pansement doit être sec en tout temps:

⇒ il est recommandé de **prendre un bain** en protégeant le **pansement** et les **deux branches du cathéter** avec une serviette épaisse qui couvre l'épaule.

⇒ Si c'est impossible de prendre un bain (à cause de pansements aux pieds ou de difficulté à sortir du bain ou toute autre raison) : il faut couvrir le **pansement** et les **deux branches du cathéter** avec une pellicule plastifiée imperméable (ex: saran wrap) que vous fixez avec du diachylon avant le bain à l'éponge ou la douche.

⇒ Si vous êtes porteur d'un cathéter dans la région de l'aîne, le bain à l'éponge est recommandé en protégeant le **pansement** et les **deux branches du cathéter** avec une serviette.

. Les baignades dans les piscines et les lacs sont interdites à cause du risque de contamination du site de sortie du cathéter.

. Noter tous signes d'infection au site de votre cathéter.

- rougeur
- douleur
- chaleur
- enflure

. Noter si votre température augmente ou si vous faites de la fièvre (ex : si votre température buccale est plus que 37.5°C) et si vous avez des frissons.

Aviser votre centre de dialyse

. Si votre pansement est décollé, souillé ou mouillé.

. Si les bouchons blancs sont enlevés ou tombés.

. Si vous faites de la fièvre ou avez des frissons à la maison

. S'il y a écoulement de sang abondant : restez calme. Appliquez une pression au site du saignement. Téléphonnez à votre centre de dialyse.

. Si le cathéter sort du site : restez calme, étendez-vous et appliquez une pression sur le site de sortie pour 10 minutes et avisez votre centre de dialyse.

. Si vous avez des inquiétudes ou des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre centre de dialyse.