

TOMODENSITOMÉTRIE



INTRACRÂNIENNE



Scan cérébral

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

5415, boul. de l'Assomption
Montréal QC H1T 2M4
Téléphone: (514) 252-3400
www.maisonneuve-rosemont.info

Tous droits réservés
©HMR, 2002

CP-SFE-029

Pour vous, pour la vie

Précaution

Si l'enfant passe un scan avec infusion, avisez s'il est **allergique** à l'iode ou aux aliments contenant de l'iode (poisson, fruits de mer).

Avant l'examen

- Comme l'enfant doit demeurer immobile durant l'examen, on doit souvent le faire dormir quand il est jeune.
- Après avoir pesé l'enfant, le médecin prescrit l'Hydrate de chloral (un médicament en sirop pour dormir).
- Après environ 1/2 heure, si l'enfant ne dort pas, on lui fera prescrire une injection intra-musculaire (coktrail sédatif).
- S'il s'agit d'un scan avec infusion, l'infirmière de l'étage posera un soluté à l'enfant avant de le faire dormir.
- Vous pourrez accompagner votre enfant au scan I (1^{er} étage) mais vous ne pourrez assister à l'examen.

Description de l'examen

- Après avoir mis un bonnet sur sa tête, on couchera l'enfant sur une table qui avance et recule pour prendre les rayons-X.
- L'appareil ressemble à un gros cylindre et est placé autour de la tête de l'enfant.

Après l'examen

- Si on a endormi l'enfant, il peut dormir plusieurs heures après l'examen.
 - On ne doit pas le laisser marcher sans surveillance quand il se lèvera la première fois.
 - S'il était à jeun, on le fait manger.
 - S'il avait un soluté, on l'enlève.
- Nous espérons que ces quelques informations sauront vous être utiles.