

Vous avez reçu une lettre pour un traitement à la clinique de colposcopie. Voici quelques informations qui vous seront utiles.

Qu'est-ce que l'anse diathermique?

Cette intervention consiste à l'ablation ou l'exérèse de couches de cellules anormales sur le col avec un instrument tranchant fonctionnant à l'électricité que l'on appelle «anse diathermique».

Ce traitement de quelques minutes se fait à la clinique de colposcopie. Le col de l'utérus est gelé à l'aide d'un anesthésiant liquide pour diminuer les douleurs. Par la suite, le médecin procède à l'exérèse de la lésion. Les prélèvements de tissus seront déposés dans un contenant puis acheminés au laboratoire pour y être analysés.

Des visites subséquentes aux 4 mois seront nécessaires selon le type de lésion pour assurer un suivi adéquat.

Recommandations

- Des pertes jaune beige de quantités variables peuvent survenir dans les jours suivants le traitement ainsi que des pertes sanguines. Habituellement de courte durée et peu abondantes, les pertes sanguines peuvent persister quelques semaines. Rarement, elles seront aussi abondantes qu'une menstruation pour quelques jours.
- 10 jours sans relation sexuelle avec pénétration ou plus, si saignement, pour permettre une meilleure cicatrisation de la plaie.
- Pas de sport violent pour 48 heures.
- Pas de tampon, seulement des serviettes hygiéniques.

Signaux d'alerte

- Saignements importants nécessitant le changement d'une serviette hygiénique à toutes les heures pendant 4 à 6 heures de suite,
- Fièvre au-dessus de 38°C durant 24 à 48 heures,
- Douleurs importantes au bas-ventre.

Si des questions vous préoccupent, n'hésitez pas à nous contacter au 514-252-3581.

Questions pour le médecin
