

TRAITEMENT DE LA

DYSFONCTION ÉRECTILE



Le viagra (sildénafil)

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

5415, boul. de l'Assomption
Montréal OC H1T 2M4
Téléphone: (514) 252-3400
www.maisonneuve-rosemont.info

Tous droits réservés

©HMR; 2002
Patricia Caron, inf. bachelière
Esther Blanchet, pharmacienne

CP-MED-009

Pour vous, pour la vie

Quelques considérations spéciales

Notes personnelles

Il a été démontré que le Viagra accentue l'effet des médicaments contenant des dérivés nitrés (nitroglycérine sous toutes ses formes tels que comprimés, vaporisateur ou timbres). L'Indur, l'Isordil, le Nitrodur et le Nitrospray en sont quelques exemples.

La nitroglycérine est utilisée dans la prévention ou dans le traitement des crises d'angine en provoquant une dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui augmente l'apport d'oxygène au coeur.

Ainsi, une dilatation plus importante des vaisseaux sanguins provoquée par l'association du Viagra et de la nitroglycérine peut être mortelle.

Si une érection dure plus de 4 heures et/ou est douloureuse, vous devez vous rendre à l'hôpital sans tarder.

Des interactions avec d'autres médicaments sont possibles; il est donc prudent d'aviser votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout autre médicament.

Avisez votre médecin ou votre pharmacien si vous ressentez des effets secondaires importants et incommodes...
